



**95%** est le taux d'efficacité des vaccins destinés aux nourrissons

À L'EXCEPTION DU VACCIN CONTRE LA COQUELUCHE DONT L'EFFICACITÉ SE SITUE AUTOUR DE 90%\*

\* Santé publique France, 2017

## ONZE VACCINS

DÉSORMAIS OBLIGATOIRES POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS NÉS APRÈS LE 1<sup>ER</sup> JANVIER 2018, SONT REMBOURSÉS À 100% : L'ASSURANCE-MALADIE PREND EN CHARGE 65%, LES MUTUELLES LES 35% RESTANTS.

**LA VACCINATION : UN MOYEN DE SE PROTÉGER ET DE PROTÉGER LES AUTRES !**

Le vaccin permet d'éviter de développer des maladies infectieuses et par conséquent de les transmettre aux autres. A travers la vaccination, on se protège donc soi-même, mais on protège aussi les autres, notamment ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire vacciner, comme les personnes malades, les femmes enceintes ou les nouveaux nés. **Les personnes vaccinées agissent, vis-à-vis du reste de la population,**

comme des barrières contre la maladie, en interrompant la chaîne de transmission.

### LA VACCINATION OBLIGATOIRE CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 2 ANS

Face à la réapparition de certaines maladies infectieuses et pour accroître le taux de couvertures vaccinales, la loi a rendu obligatoire onze vaccins pour les enfants de moins de 2 ans nés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018. Pour ces derniers, ces vaccinations seront exigées pour l'entrée en collectivité : crèche, école, garderie...

Ces onze vaccins concernent : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'*Haemophilus influenzae* b, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Pour les enfants nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 2018, seules les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, aux âges de 2, 4 et 11 mois, continuent d'être exigibles pour entrer en collectivité. Les huit autres vaccins sont toutefois vivement recommandés.

Pour les enfants de plus de 12 mois résidant en Guyane française, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire.

### EXISTE-T-IL DES RISQUES LIÉS À LA VACCINATION ?

Chaque année, plusieurs centaines de millions de personnes se font vacciner à travers le monde. Au même titre que les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires (fièvre modérée et douleur ou rougeur au point d'injection). La plupart des réactions vaccinales sont mineures et passagères, tandis que les éventuels effets indésirables des vaccins sont très surveillés. **Il est beaucoup plus risqué d'attraper une maladie grave en ne se vaccinant pas que de s'exposer à un effet indésirable lié au vaccin.**

### VACCINATION ET GROSSESSE


A ce jour, aucun lien entre un vaccin et des conséquences sur un fœtus n'a été prouvé. Néanmoins, il est recommandé de reporter les vaccinations après l'accouchement, sauf si elles sont indispensables en raison de circonstances particulières (voyage à l'étranger, épidémie...). Quel que soit le stade de la grossesse, la vaccination contre la grippe est recommandée chez la femme enceinte.

**2,5**  
MILLIONS  
DE VIE

sont sauvées dans le monde chaque année grâce à la vaccination

## CALENDRIER SIMPLIFIÉ DES VACCINATIONS 2018

VACCINATION : ÊTES-VOUS À JOUR ?

Âge approprié	2 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois
Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite						
Coqueluche						
Haemophilus Influenza de Type B (HIB)						
Hépatite B						
Pneumocoque						
Méningocoque C						
Rougeole - Oreillons Rubéole						

### BON À SAVOIR

« ÊTRE À JOUR DANS SA VACCINATION » QU'EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?

- ▶ Être à jour, c'est avoir reçu les vaccins recommandés en fonction de son âge et avec le bon nombre d'injections pour être protégé.

SI LES VACCINS NE SONT PAS À JOUR ?

- ▶ Il n'est pas forcément nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue. On parle alors de « rattrapage ».

## VACCINATION ET GROSSESSE

### AVANT LA GROSSESSE

- Coqueluche
- Rougeole - Oreillons Rubéole (ROR)
- Varicelle [si pas eu la varicelle]

### PENDANT LA GROSSESSE

- Grippe

### APRÈS LA GROSSESSE

- Coqueluche
- Rougeole - Oreillons Rubéole (ROR) [vérifier que 2 injections ont été faites]
- Varicelle [si pas eu la varicelle]